

## ULOTKA INFORMACYJNA NR 1

### Zasady kwalifikacji pacjentów do znieczulenia/ analgosedacji do zabiegów endoskopowych w warunkach ambulatoryjnych

Przeprowadzenie badań endoskopowych w znieczuleniu możliwe jest wyłącznie po uprzedniej **kwalifikacji anestezjologicznej**. Pacjenci mają obowiązek dostarczyć czytelnie wypełnioną i podpisaną ankietę anestezjologiczną (do pobrania w placówce albo na naszej stronie internetowej [www.centrumgh.pl](http://www.centrumgh.pl)) na **ok. 30 dni przez terminem badania**. Brak ankiety na **7 dni przed badaniem** dyskwalifikuje pacjenta od znieczulenia w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji termin badania zostanie przełożony albo badanie odbędzie się bez udziału anestezjologa.

Od pacjentów z przewlekłymi schorzeniami w okresie ich wyrównania i stabilizacji może być wymagane (przed ostateczną kwalifikacją) dostarczenie **dodatkowej dokumentacji medycznej**, wyników badań, konsultacji specjalistycznych (najpóźniej 7 dni przed terminem badania). O fakcie tym pacjenci zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.

Poniżej przedstawiamy listę sytuacji i schorzeń, których obecność uniemożliwi wykonanie znieczulenia w warunkach ambulatoryjnych. Omów swój stan zdrowia z lekarzem kierującym Cię na badanie endoskopowe. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z placówką (**71/308-44-00**; email: [ankiety@centrumgh.pl](mailto:ankiety@centrumgh.pl))

|                                                                         |  |                                                                    |  |
|-------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------------------|--|
| Skrajna otyłość: BMI powyżej 40<br>Znaczne niedożywienie BMI poniżej 16 |  | Wiek poniżej 18 lat                                                |  |
| Brak Świadomej zgody                                                    |  | Zespół bezdechu nocnego ( maska CPAP)                              |  |
| Głęboka depresja                                                        |  | Domowa tlenoterapia ( używanie koncentratora tlenu)                |  |
| Brak współpracy (demencja, inne upośledzenia umysłowe)                  |  | Zaawansowane choroby płuc: POCHP<br>astma oskrzelowa               |  |
| Nasiloną ch. Parkinsona                                                 |  | Wszystkie niestabilne choroby przewlekłe<br>w tym choroba wieńcowa |  |
| Dystrofia mięśniowa, miastenia                                          |  | Przebyty w ostatnich 6 miesiącach zawał<br>m.serca                 |  |
| Schorzenia kręgosłupa uniemożliwiające ułożenie pacjenta                |  | Przebyty w ostatnich 6 miesiącach udar<br>mózgu                    |  |
| Powikłania znieczulenia w wywiadzie                                     |  | Przyjmowanie leków z grupy inhibitorów<br>MAO                      |  |
| Aktualna infekcja i do 2 tygodni po niej                                |  | Rodzinne występowanie hipertermii<br>złośliwej                     |  |

Pacjenci, u których istnieją bezwzględne przeciwwskazania do znieczulenia w warunkach ambulatoryjnych (jak wyżej) zostaną o tym poinformowani mailowo lub telefonicznie. U tych pacjentów badania endoskopowe w znieczuleniu mogą być wykonane, ale tylko w **warunkach szpitalnych** ze względu na podwyższone ryzyko wystąpienia powikłań podczas znieczulenia.