

INFORMACJA DLA PACJENTA

Zasady kwalifikacji pacjentów do znieczulenia/ analgosedacji do zabiegów endoskopowych w warunkach ambulatoryjnych

Przeprowadzenie badań endoskopowych w znieczuleniu możliwe jest wyłącznie po uprzedniej **kwalifikacji anestezyjologicznej**. Pacjenci mają obowiązek dostarczyć czytelnie wypełnioną i podpisaną ankietę anestezyjologiczną (do pobrania w placówce albo na naszej stronie internetowej www.centrumgh.pl) na **ok. 30 dni przed terminem badania**. Brak ankiety na **7 dni przed badaniem** dyskwalifikuje pacjenta od znieczulenia w wyznaczonym terminie. W takiej sytuacji termin badania zostanie przełożony albo badanie odbędzie się bez udziału anestezyjologa.

Od pacjentów z przewlekłymi schorzeniami w okresie ich wyrównania i stabilizacji może być wymagane (przed ostateczną kwalifikacją) dostarczenie **dodatkowej dokumentacji medycznej**, wyników badań, konsultacji specjalistycznych (najpóźniej 7 dni przed terminem badania). Pacjenci otrzymają informację na temat zaleceń lekarza anestezyjologa telefonicznie lub mailowo.

Poniżej przedstawiamy listę sytuacji i schorzeń, których obecność najprawdopodobniej uniemożliwi wykonanie znieczulenia w warunkach ambulatoryjnych. Omów swój stan zdrowia z lekarzem kierującym Cię na badanie endoskopowe. W razie wątpliwości zachęcamy do kontaktu z placówką (**71/308-44-00**; email: ankiety@centrumgh.pl)

| | | | |
|--|--|---|--|
| Skrajna otyłość: BMI powyżej 40 Znaczne niedożywienie: BMI poniżej 16 | | Wiek poniżej 18 lat | |
| Brak świadomej zgody | | Zespół bezdechu nocnego | |
| Głęboka depresja | | Domowa tlenoterapia (używanie koncentratora tlenu) | |
| Brak współpracy (demencja, inne upośledzenia) | | Zaawansowane choroby płuc: POCHP astma oskrzelowa | |
| Nasilona ch. Parkinsona | | Wszystkie niestabilne choroby przewlekłe ASA III, IV | |
| Ogólny zły stan pacjenta | | Niestabilna choroba wieńcowa | |
| Aktualna infekcja i do 2 tygodni po niej | | Przebyty w ostatnich 6 miesiącach zawał m. serca | |
| Powikłania znieczulenia w wywiadzie | | Przebyty w ostatnich 6 miesiącach udar mózgu | |
| Uczulenie na orzeszki ziemne i soję | | Przyjmowanie leków z grupy inhibitorów MAO | |
| Schorzenia kręgosłupa uniemożliwiające ułożenie pacjenta | | Rodzinne występowanie hipertermii złośliwej | |

Pacjenci, u których istnieją bezwzględne przeciwwskazania do znieczulenia w warunkach ambulatoryjnych (jak wyżej) zostaną o tym poinformowani mailowo lub telefonicznie. U tych pacjentów badania endoskopowe w znieczuleniu mogą być wykonane, ale tylko w **warunkach szpitalnych** ze względu na podwyższone ryzyko znieczulenia.